

사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 신장애 환자
- 2) 만 2세 미만의 영아(산제에 한함.)
- 3) 만 7세 미만의 영아(정제에 한함.)

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

기침 및/또는 가래를 제거하는 제제(아트로핀 류)

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 위장관(창자)에 아픈 부위(소화성궤양)가 있는 사람
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임상자료가 없어서 추천되지 않는다.), 수유부
- 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 4) 고름, 화농성 가래가 있거나, 열이 나거나, 만성 기관지 및 폐 질환이 있는 사람
- 5) 당뇨 또는 저혈당 식이요법을 하는 사람(예, 구성성분)(산제에 한함)

4. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 여러 차례 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의할 것.
- 3) 소화장애 현상(복통, 구토, 설사)이 나타난 경우 복용량을 줄일 것.
- 4) 가려움, 두드러기, 홍반성 발진, 얼굴 부기와 같은 알레르기 피부 이상반응이 나타날 수 있다. 또한, 매우 드물게 아나필락시스가 나타날 수 있다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적은 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관할 것.

3) 잘못된 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않을 것.