

사용상의주의사항

1. 다음 부위에는 사용하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
- 2) 당뇨병 환자
- 3) 혈액순환장애 환자
- 4) 눈주위 및 점막
- 5) 감염, 염증, 발적 또는 자극이 있는 부위
- 6) 심근경색 및 그 병력이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 2) 약물 등에 의해 알레르기 증상을 일으켰던 적이 있는 사람
- 3) 약물 적용 부위가 넓은 사람
- 4) 습윤이나 진물이 심한 사람
- 5) 심한 상처가 있는 사람
- 6) 경변이 심한 사람
- 7) 신부전 환자(살리실염이 피부에 대량 흡수될 경우 중독을 유발하므로 신부전 환자에는 광범위한 피부에 장기간 적용하지 않는다.)
- 8) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(살리실산염은 피부를 통하여 많은 양이 흡수되어 중독 증상이 나타날 수 있으므로 넓은 피부표면에 대한 임부의 장기간의 사용은 피한다)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것, 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 피부 발진, 발적, 가려움이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.

2) 2주간 정도 사용해도 증상이 나아지지 않거나 본제품의 사용에 의해 증상이 악화된 경우 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

3) 본 제품은 적용 부위에 상처가 있는 경우, 국소적인 자극이 나타날 수 있으며, 자극이 지속될 경우 사용을 중지한다.

4) 본 제품의 사용에 의해 피부 건조감, 발적(충혈되어 붉어짐)이 나타날 경우 사용을 일시 중지하고, 다시 사용할 경우 간격을 두고 사용한다.

4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

1) 이 약은 외용으로만 적용하고, 이 약의 정해진 용법 용량을 잘 지킨다.

2) 소아에게 사용할 경우에는, 보호자의 지도 감독 하에 사용한다. 소아는 부작용이 나타나기 쉬우므로 대량을 광범위한 부위에 적용하거나 장기간 사용하지 않는다.

3) 눈에 들어가지 않도록 주의한다. 만일, 눈에 들어간 경우에는 즉시 물 또는 미지근한 물로 씻어낸다. 또한 증상이 심한 경우에는 의사의 진료를 받는다.

4) 국소에만 사용한다.

5) 화농성피부염, 습윤, 미란(긁무름)의 경우에는 이를 미리 치료한 후 이 약을 적용한다.

6) 적용부위 이외의 피부에 닿지 않도록 주의한다.

7) 실수로 이 약을 복용한 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.

5. 저장상의 주의사항

1) 직사광선을 피하고 가능한 한 서늘한 곳에 뚜껑을 잘 닫아 보관한다.

2) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

4) 사용기간이 지난 제품은 사용하지 않는다. 또한, 사용기간 내라도 개봉 후에는 가급적 빨리 사용한다.

5) 재질에 따라 변색의 위험이 있으므로 가구, 바닥 등에 묻지 않도록 주의한다.

6) 화기 근처에 두지 않는다.