

# 사용상의주의사항

## 1. 다음 환자(부위)에는 투여하지 말것

- 1) 30개월이하의 유아
- 2) 습진, 옷등에 의한 피부염, 상처부위

## 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 지금까지 약이나 화장품등에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 옷 등에 의한 피부염 등)이 나타난적이 있는 환자
- 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자
- 3) 습윤이나 미란(긁무름)이 심한 환자
- 4) 소아(경련을 유발할 수 있다.)
- 5) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(살리실산염은 피부를 통하여 많은 양이 흡수되어 중독 증상이 나타날 수 있으므로 넓은 피부표면에 대한 임부의 장기간의 사용은 피한다)

## 3. 부작용

이 약의 사용으로 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용 을 중지하고 약 사 또는 의사와 상의한다.

## 4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
- 2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 사용한다.
- 3) 5~6일간 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 사용을 중지 하고 약사 또는 의사와 상의한다.

## 5. 적용상의 주의

이 약은 외용으로만 사용한다.

## 6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사일광을 피하고 될수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아) 보관한다.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.