

사용상의주의사항

1. 다음 환자(부위)에는 투여하지 마십시오.

- 1) 30개월 이하의 유아
- 2) 습진, 옷 등에 의한 피부염, 상처부위

2. 다음 사람은 신중히 투여하십시오.

- 1) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진 · 발적[충혈되어 붉어짐], 가려움, 옷 등에 의한 피부염 등)이 나타난 적이 있는 환자
- 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자
- 3) 습윤[습기 참]이나 미란[긁무름]이 심한 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 5) 소아(경련을 유발할 수 있습니다)
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(살리실산염은 피부를 통하여 많은 양이 흡수되어 중독 증상이 나타날 수 있으므로 넓은 피부표면에 대한 임부의 장기간의 사용은 피한다)

3. 부작용

이 약의 사용으로 발진 · 발적[충혈되어 붉어짐], 가려움 등의 증상이 나타나는 경우 에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- 2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 사용하십시오.
- 3) 5 ~ 6일간 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

5. 적용상의 주의

이 약은 외용으로만 사용하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여[뚜껑을 꼭 닫아] 보관하십시오.
- 3) 오용[잘못 사용]을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.