

사용상의주의사항

1. 다음 부위에는 사용하지 마십시오.

- 1) 눈주위, 점막 등
- 2) 습진, 옷 등에 의한 피부염 및 상처 부위

2. 다음 사람은 사용 전에 약사 또는 의사와 상의 하십시오.

- 1) 지금까지 화장품이나 약에 의한 알레르기 증상(예를 들면 : 발진 · 발적[충혈되어 붉어짐], 가려움증, 옷 등에 의한 피부염 등)이 나타난 적이 있는 사람
- 2) 습윤[습기 참]이나 짓무름이 심한 사람
- 3) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(살리실산염은 피부를 통하여 많은 양이 흡수되어 중독증상이 나타날 수 있으므로 넓은 피부표면에 대한 임부의 장기간의 사용은 피한다)

3. 사용할 때 다음에 주의하십시오.

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- 2) 소아에 사용할 경우에는 보호자의 지도, 감독 하에 사용하십시오.
- 3) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 마십시오.

4. 사용중 또는 사용후에는 다음에 주의하십시오.

- 1) 이 약의 사용으로 인해 발진, 발적[충혈되어 붉어짐], 가려움 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
- 2) 수일간 사용하여도 증상이 개선되지 않을 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오

5. 보존 및 취급상의 주의

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보존하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 대로 서늘한 곳에 밀전하여[뚜껑을 꼭 닫아] 보관하십시오.

3) 오용[잘못 사용]을 막고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.