

사용상의주의사항

1. 경고

슈도에페드린 함유 의약품 복용시 급성 전신성 발진성 농포증[고름물집증](AGEP)과 같은 중증[심한 증상] 피부 이상반응이 나타날 수 있다. 발열, 홍반[붉은 반점], 다수의 작은 농포[고름물집]와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 한다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) MAO억제제를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 2) 중증 또는 조절되지 않는 고혈압 환자
- 3) 중증 급성 또는 만성 신장질환/신부전 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

다른 진해[기침을 그치게 함]거담제[감기약], 감기약, 항히스타민제, 진정제, 알코올 등

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉피부염, 알레르기 비염[코염], 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 환자
- 2) 약으로 알레르기 증상(예, 발열, 발진, 관절통, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 3) 간장애, 신장애[신장장애], 갑상샘질환, 당뇨병 등 병이 있는 환자, 고열 환자, 허약자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 6) 심장애 및 고혈압 환자
- 7) 다음과 같은 기침이 있는 사람

과도한 가래가 동반되는 기침, 천식과 같은 지속 또는 만성 기침

5. 소아에 대한 투여

만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다(시럽제에 한함).

6. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약을 복용하는 동안 발진, 발적[충혈되어 붉어짐], 구역, 구토, 식욕부진, 어지럼, 불안, 불면 등이 나타날 경우
- 2) 급성 전신성 발진성 농포증[고름물집증](AGEP), 발열, 홍반[붉은 반점], 다수의 작은 농포[고름물집]와 같은 중증[심한 증상] 피부 이상반응이 나타날 경우
- 3) 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 4) 기침이 7일 이상 지속되거나 발열, 지속적인 두통을 동반한 경우
- 5) 슈도에페드린 성분과 관련하여 허혈성 대장염의 증상(급격한 복통, 직장 출혈 등)이 발현될 경우
- 6) 슈도에페드린 성분과 관련하여 가역적 후뇌 병증 증후군 및 가역적 뇌혈관 수축 증후군 증상(갑작스러운 심한 두통, 번개 두통, 구역, 구토, 혼돈, 발작, 시각 장애 등)이 발현되는 경우

7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 복용시킬 것.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전[뚜껑을 꼭 닫음]하여 보관할 것.
- 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용[잘못 사용]에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관할 것.