

사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말것

- 1) 클로르헥시딘 혹은 이 제제의 다른성분에 과민증의 병력이 있는 경우
- 2) 피부의 외피이상보다 더 깊은 상처가 있는 경우
- 3) 임부 및 수유부

2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 약을 사용하지 말것

저해작용(길항,불활성화) 이 나타날 우려가 있으므로 소독약과 비누의 동시 또는 연속적인 사용을 피할것

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 신중히 사용할것(의사, 약사와 상의할것)

- 1) 천식등 알레르기 질환 및 그 병력 또는 가족력이 있는 사람
- 2) 상처난 피부(특히 화상) 에 사용할 경우

4. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말것

- 1) 삼키거나 주사하지 말고 반드시 외용으로만 사용할것
- 2) 뇌, 뇌막 ,눈,귀, 입과 접촉해서는 안되고, 고막천공이 있는 경우 청각관에 침부되지 않도록 할것
- 3) 국소알러지, 접촉성 습진의 전신발현 위험이 있는 상처난 피부나 점막에 적용시 위험성이 증가된다. 특히 생식기 점막에 사용하지 말것
- 4) 이 약을 적용한 손으로 절대로 눈을 만지지 말것. 눈에 접촉 시 각막이식을 요할 수 있는 중대한 각막손상 (각막미란, 상피결손/각막손상, 심각한 영구 시각장애)을 일으킬 수 있으며, 눈에 들어가서 남을 경우 심각하고 영구적인 안구상태를 가져올수 있다. 눈에 들어갔을 경우 찬물로 바로 씻는다.

5. 이상반응

- 1) 클로르헥시딘의 피부흡수는 매우 작지만, 전신효과에 대한 위험을 배제할수 없다.
- 2) 자극, 감작성, 알러지반응 드물게 아나필락시스성 속까지도 일으킬 수 있으므로 이러한 경우 즉시 투여를 중지하고 의사에게 문의할것

6. 과량투여

1) 경구로 대량 섭취했을 경우 병원에 갈것. 섭취시에는 우유, 날계란, 젤라틴 또는 저농도 비눗물을 사용하여 위세척을 하고 폐흡입술은 피한다. 아포모르핀은 사용하지 않으며 필요하다면 호흡을 도와주고 환자를 따뜻하게 유지한다. 과당주사는 알코올 대사를 촉진 할수 있다. 심각한 경우에는 혈액투석이나 복막투석이 필요할 수도 있다..

2) 알코올 함량을 고려하여 처치할것

7. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

1) 인화성 액체이므로 주의할것

2) 화상의 위험이 있으므로 전기기구 사용 전에 건조시킨다.

3) 세제나 다른 화학물질과 섞지 말것

4) 음이온성 유도체와 배합금기임

5) 어린이가 삼켰을 경우 바로 병원에 갈것

6) 수술기구 소독에는 사용하지 말것