

# 사용상의주의사항

## 1. 다음 환자(부위)에는 투여하지 말 것.

- 1) 클로르헥시딘에 과민증의 병력이 있는 경우
- 2) 수술기구 소독에는 사용하지 말 것.
- 3) 뇌, 척수, 눈과 접촉해서는 안되고, 고막천공이 있는 경우 청각관에 침투되지 않도록 할 것.
- 4) 점막, 특히 생식기 점막에 사용하지 말 것.

## 2. 다음 환자(부위)에는 신중히 투여할 것

클로르헥시딘의 피부흡수는 매우 작지만, 전신효과에 대한 위험을 배제할 수 없다.

상처난 피부(특히 화상), 점막, 태아의 미성숙 피부의 넓은 부위에 사용될 경우 위험성은 커진다.

## 3. 부작용

- 1) 국소 알러지, 접촉성 습진의 전신발현 위험이 있다. 상처난 피부나 점막에 적용시 위험성이 증가된다.
- 2) 전신 알러지 위험이 있으며, 드물게 아나필락시스성 속까지도 일으킬 수 있다.

## 4. 상호작용

저해작용(길항, 불활성화)이 나타날 우려가 있으므로, 소독약과 비누의 동시 또는 연속적인 사용을 피할 것.

## 5. 과량투여

- 1) 경구로 대량 섭취했을 경우 병원에 갈 것.
- 2) 알콜 함량을 고려할 것.

## 6. 적용상의 주의

- 1) 삼키거나 주사하지 말고, 반드시 외용으로만 사용할 것.
- 2) 세제나 다른 화학물질과 섞지 말 것.
- 3) 인화성 액체이므로 주의할 것.

4) 음이온성 유도체와 물리화학적으로 양립할 수 없다.

5) 화상의 위험이 있으므로 전기기구 사용 전에 건조시킨다.

6) 눈에 접촉 시 각막이식을 요할 수 있는 중대한 각막손상(각막미란, 상피결손/각막손상, 심각한 영구 시각 장애)을 일으킬 수 있다.