

사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람 또는 부위에 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 클로르헥시딘 제제에 과민반응 환자
- 2) 뇌, 척수, 귀(내이, 중이, 외이)(청각신경 또는 중추신경에 직접 사용할 경우 난청, 신경장애를 일으킬 수 있다)
- 3) 질, 방광, 구강 등의 점막면(쇼크가 나타났다는 보고가 있으며 초기증상으로는 구역, 불쾌감, 식은땀, 어지럼, 답답함, 호흡곤란, 발적 등이 있다)
- 4) 눈
- 5) 미란(긁무름) 또는 화농성인 환부

2. 다음과 같은 사람 또는 부위에 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(발진·발적, 가려움, 미란(긁무름) 등)이 나타난 적이 있는 사람
- 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 3) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 4) 환부가 광범위한 사람
- 5) 상처가 심하거나 화상이 심한 사람
- 6) 분만 직전의 외음부 주위(신생아의 눈 등에 들어가 악영향을 미칠 수 있다)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부 문서를 소지할 것.

- 1) 쇼크 : 드물게 쇼크증상이 일어날 수 있으므로 충분히 관찰하고 구역, 불쾌감, 식은땀, 답답함, 호흡곤란, 발작 등의 증상이 나타나는 경우
- 2) 과민반응 : 때때로 발진·발적, 두드러기, 가려움, 부종 등의 과민증상이 나타날 경우
- 3) 5 ~ 6일간 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우

4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 사용할 것.
- 3) 쇼크 발현에 대비하여 사용시 클로르헥시딘제제에 대한 과민반응의 병력, 약물과민체질 여부 등을 충분히 문진할 것.
- 4) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 말 것.
- 5) 눈에 접촉시 각막손상을 일으킬 수 있으므로 눈에 접촉 시 각막이식을 요할 수 있는 중대한 각막손상(각막 미란, 상피결손/각막손상, 심각한 영구 시각장애)을 일으킬 수 있으므로 눈에 들어가지 않도록 주의하고 만약 들어갔을 경우에는 즉시 깨끗한 물로 잘 씻어낼 것. 증상이 심할 경우에는 안과의사의 치료를 받을 것.
- 6) 혈청, 고름 등의 유기물질이나 비누류에 의하여 살균작용이 악화되므로 사용농도, 시간 등에 유의하고 비누를 사용할 경우에는 사전에 충분히 씻어낸 후에 사용할 것.
- 7) 음이온에 의하여 난용성염을 생성하므로 희석하는 경우에는 깨끗한 증류수를 사용할 것.
- 8) 광범위하게 또는 장기간 사용하는 경우에는 증기를 흡입하지 않도록 주의할 것.
- 9) 사용하기 전 상처난 부위와 주위의 오염물질 등을 깨끗이 씻어낸 후 사용할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.