

# 사용상의주의사항

## 1. 다음 환자(부위)에는 투여하지 말 것.

- 1) 클로르헥시딘제제에 대하여 과민증의 병력이 있는 환자.
- 2) 구강 등의 점막면 (속이 나타났다는 보고가 있으며 초기증상으로는 구역, 불쾌감, 식은땀, 어지러움, 답답함, 호흡곤란, 발적 등이 있다.
- 3) 손상피부 및 점막 (에탄올을 함유하므로 손상피부 및 점막에의 사용에 의해 자극작용을 갖는다.)

## 2. 다음 환자(부위)에는 신중히 투여할 것.

- 1) 다른 약물에 과민증 환자.
- 2) 천식 등의 알레르기 질환 및 병력 또는 가족력이 있는 환자.

## 3. 이상반응

- 1) 속 (0.1% 미만) : 드물게 속이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고, 구역, 불쾌감, 식은땀, 어지러움, 답답함, 호흡곤란, 발적 등의 증상이 나타날 경우에는 즉시 사용을 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 2) 과민증 : 때때로 발진, 두드러기 등의 과민증상 및 고농도에서 자극감이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 사용을 중지한다.

## 4. 일반적 주의

- 1) 속 발현에 대비하여 사용 시 클로르헥시딘제제에 대한 과민증의 병력, 약물과민체질 여부등을 충분히 문진해야 한다.
- 2) 클로르헥시딘제제로 인해 속을 일으킨 환자 중 몇 명에서 혈청 중 클로르헥시딘에 특이적인 IgE 항체가 검출된 보고가 있다.
- 3) 이 약은 회석하지 않고 원액 그대로 사용한다.
- 4) 눈에 접촉 시 각막이식을 요할 수 있는 중대한 각막손상(각막미란, 상피결손/각막손상, 심각한 영구 시각장애)을 일으킬 수 있으므로 눈에 들어가지 않도록 주의하고, 만약 들어갔을 경우에는 즉시 깨끗한 물로 잘 씻어낸다.

## 5. 적용상의 주의

- 1) 손 소독 이외의 목적으로 사용하지 않는다.
- 2) 반복 사용한 경우에는 탈지 등의 의한 피부가 거칠어 질 수 있으므로 주의한다.
- 3) 혈청, 농 등의 유기물질은 이 약의 살균작용을 약화시키므로, 이들이 부착되어 있을 경우에는 충분히 씻어낸 후 사용한다.
- 4) 비누류는 이 약의 살균작용을 약화시키므로, 예비세정에 사용한 비누액을 충분히 씻어낸 후 사용한다.
- 5) 인화성, 휘발성이 있으므로 화기에는 충분히 주의한다.

#### 6. 저장상의 주의사항

- 1) 기밀용기에 보관한다.
- 2) 보관소의 적당한 온도를 유지하고 서늘한 장소에 놓는다.
- 3) 직사광선을 피한다.