

□ 당뇨병치료제 효능효과 기재방식 개선(안)

○ 당뇨병치료제 효능·효과 기재 간략화

- (대표 적응증) 제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절 * 현행과 동일
- 단독요법 또는 병용요법을 기재하되, 병용요법은 병용약물 나열 없이 '다른 혈당강하제와 병용'으로 기재

* 메트포르민과 병용요법 임상시험만 제출한 경우 '메트포르민과 병용'으로 기재

- 병용요법 등 임상시험 상세내용은 사용상의 주의사항 중 '전문가용 정보'에 기재

현행	개선안
<p>제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절</p> <ul style="list-style-type: none"> - 단독요법 - <u>메트포르민과 병용요법</u> - <u>설폰닐우레아 계열과 병용요법</u> - <u>인슐린과 병용요법</u> - <u>피오글리타존과 병용요법</u> - <u>시타글립틴과 병용요법 등</u> <p>(예시)</p>	<p>제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절 (<u>'사용상의 주의 사항' 중 '임상시험 정보'항 참조</u>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 단독요법 - <u>병용요법</u> <p><u>다른 혈당강하제 (또는 메트포르민*)로 충분한 혈당조절을 할 수 없는 경우 이 약을 병용투여</u></p> <p>* <u>메트포르민과의 병용요법 임상시험만 제출하는 경우</u></p>