



# 인플루엔자 바이러스 치료제 안전사용 길라잡이



오셀타미비르  
발록사비르



자나미비르



페라미비르



식품의약품안전처



한국의약품안전관리원

# 인플루엔자 바이러스 치료제에는 어떤 약들이 있나요?



※ 인플루엔자 감염의 초기 증상 발현 48시간 이내에 투여를 시작합니다.

※ 예방의 일차요법은 백신요법이므로 독감 치료제는 백신 대신 사용할 수 없습니다.



**먹는약으로 오셀타미비르 성분 및 발록사비르 성분 제제가 있습니다.**

## ▷ 오셀타미비르 치료 및 예방

생후 2주 이상 신생아(수태 후 36주 미만 제외), 소아, 성인의 인플루엔자 A 및 B 바이러스 감염증의 치료  
1세 이상의 인플루엔자 A 및 B 바이러스 감염증의 예방

## ▷ 발록사비르 치료 및 예방

1세 이상 소아 및 성인의 인플루엔자 A 또는 B 바이러스 감염증의 치료 및 예방



**흡입하는 약으로 자나미비르 성분 제제가 있습니다.**

## ▷ 치료 및 예방

7세 이상 소아 및 성인의 인플루엔자 A 및 B 바이러스 감염증의 치료 및 예방



**주사하는 약으로 페라미비르 성분 제제가 있습니다.**

## ▷ 치료

2세 이상 소아 및 성인의 인플루엔자 A 및 B 바이러스 감염증의 치료

# 소아, 청소년의 경우 주의해야 할 사항이 있나요?



## 소아·청소년의 경우

이 약을 투여중인 인플루엔자 환자들 중 주로 소아·청소년 환자에게서 **경련과 섬망** (심한 과다 행동과 생생한 환각, 초조함, 떨림 등이 자주 나타나는 상태)과 같은 **신경정신계 이상반응** 이 나타날 수 있으며, **추락 등 사고**에 이른 사례가 보고되었습니다.

그러나이약투여로 인한것인지는 알려져 있지 않고  
**이 약을 투여하지 않았던 환자에서도 유사한 증상이 나타날 수 있습니다.**



# 환자와 함께 있어 주세요!



따라서, 보호자는 치료제 투여와 관계없이 인플루엔자 환자를

- ❶ 적어도 **2일간** 혼자 있지 않도록 함께 하고
- ❷ 창문과 베란다, 현관문 등을 **꼭 잠그며**
- ❸ **이상행동**이 나타나는지 **면밀히 관찰**해야 합니다.



보호자와 함께



창문닫기

# 이것이 궁금해요!



Q

인플루엔자 바이러스 치료제를 투약하고도 증상이 호전되지 않으면 어떻게 하나요?

A

증상이 심해지거나 호전되지 않으면 다시 의료진의 진료를 받으셔야 합니다. 특히, 호흡곤란, 흉통, 중증의 근육통, 경련, 탈수와 같은 증상이 나타나는 경우 응급처치가 필요할 수 있으므로, 바로 진료를 받아야 합니다.

Q

인플루엔자 바이러스 치료제를 해열진통제 (이부프로펜, 아세트아미노펜, 아스피린)와 함께 복용해도 될까요?

A


인플루엔자 바이러스 치료제의 효과에 영향을 미치지 않으므로 함께 복용할 수 있습니다.

Q

인플루엔자 바이러스 치료제를 임신부나 수유부도 투여 받을 수 있나요?

A

임신부, 수유부 모두 의사와 상의할 것을 권장합니다. 치료상의 유익성이 모체와 태아의 잠재적인 위험성을 상회한다고 판단된 경우에만 투여를 고려해야 합니다.



# 의약품 부작용이 발생하면?



의약품을 복용한 후 부작용이 의심되면  
의사 또는 약사와 상담한 후  
한국의약품안전관리원으로 보고해주세요.  
국민 여러분의 보고자료는  
부작용 예방대책을 마련하는 밑거름이 됩니다.

**의약품 부작용  
보고 및 피해구제 무료상담**



**1644-6223  
(14-3330)**



# 국민이 안심할 수 있는 의약품 안전정보!



식품의약품안전처



한국의약품안전관리원