

사용상의주의사항

1. 다음 환자 (부위) 에는 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 눈 주위, 점막 등
- 2) 습진, 옷 등에 의한 피부염, 상처부위

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 약사 또는 의사와 상의할 것.

- 1) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상 (예를 들면 발진 · 발적 (충혈되어 붉어짐) , 가려움, 옷 등에 의한 피부염 등) 이 나타난 적이 있는 사람
- 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 3) 약에 의하여 알레르기 증상을 일으켰던 적이 있는 사람
- 4) 습윤 (습기 참) 이나 미란 (젖무름) 이 심한 사람
- 5) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(살리실산염은 피부를 통하여 많은 양이 흡수되어 중독 증상이 나타날 수 있으므로 넓은 피부표면에 대한 임부의 장기간의 사용은 피한다)

4. 다음과 같은 경우는 이 약의 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것, 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 사용으로 인해 발진 · 발적 (충혈되어 붉어짐) , 가려움, 피부염, 색소침착, 피부박리 (피부 벗겨짐) 등의 증상이 나타나는 경우
- 2) 이 약의 사용으로 인해 때때로 심한 가려움이나 통증이 나타나는 경우

5. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 지킨다.

2) 이 약은 외용으로만 사용한다.

3) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도감독 하에 사용한다.

4) 본제 (이 약) 를 붙인 환부 (질환 부위) 를 전기모포 등으로 따뜻하게 하지 않는다.

5) 강한 자극을 느낄 수 있기 때문에 입욕 1시간 전에는 본제 (이 약) 를 떼어낸다.

또한 입욕 후에 붙일 경우에는 약 30분 후에 부착한다.

6) 환부 (질환 부위) 의 피부는 청결하게 하여 붙인다.

7) 피부가 특히 약한 사람은 같은 곳에 계속 붙이지 않는다.

8) 5,6일간 사용해도 증상이 개선이 보이지 않을 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 밀전하여 (뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.

3) 오용 (잘못 사용) 을 막고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것