

사용상의주의사항

1. 이 약은 다음의 신체 부위에는 사용하지 말 것.

(1) 눈 주위, 점막 등

(2) 습진, 피부염, 상처부위

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.

1) 지금까지 약이나 화장품등에 의한 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 피부병 등)을 경험한 적이 있는 사람.

2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(살리실산염은 피부를 통하여 많은 양이 흡수되어 중독 증상이 나타날 수 있으므로 넓은 피부표면에 대한 임부의 장기간의 사용은 피한다)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

이 약의 사용으로 인해 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 피부병, 색소침착, 피부박리(벗겨짐)등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것.

4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항.

(1) 정해진 용법 및 용량을 지킬 것.

(2) 어린이가 사용하는 경우에는 보호자의 지도감독 하에 사용할 것.

(3) 환부(질환 부위)를 깨끗이 한 후 사용할 것.

(4) 피부가 약한 사람은 같은 부위에 계속 붙이지 말 것.

5. 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

(2) 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관할 것.

(3) 개봉 후에는 개봉한 부위를 확실히 밀폐하여 원래의 용기에 넣어 보관할 것.