

사용상의주의사항

1. 다음과 같은 경우(사람)에는 사용하지 말 것.

(1) 다음 부위에는 사용하지 말 것.

- ① 눈 또는 눈주위, 점막(예를 들면 입안, 코안, 질 등), 음부, 외음부 등
- ② 습진
- ③ 습기침, 짓무름, 갈라짐 또는 상처가 심한 질환부위

(2) 만 2 세 이하의 젖먹이

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.

(1) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진 · 충혈되어 붉어짐, 가려움, 옷 등에 의한 피부염 등)을 일으킨 적이 있는 사람

(2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람

(3) 질환부위가 얼굴에 있거나 광범위한 사람

(4) 질환부위가 깊은 사람

(5) 습진과 「무좀 · 완선(사타구니백선), 체부백선의 구분이 불확실한 사람(음부가려움, 짓무름 등의 증상이 있는 경우에는 습진 등 다른 원인에 의한 경우가 많다).

(6) 유아

(7) 의사의 치료를 받고 있는 환자

(8) 고령자

(9) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(살리실산염은 피부를 통하여 많은 양이 흡수되어 중독 증상이 나타날 수 있으므로 넓은 피부표면에 대한 임부의 장기간의 사용은 피한다)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

(1) 이 약의 사용으로 인해 발진 · 충혈되어 붉어짐, 가려움, 옷 등에 의한 피부염, 부종(부기), 자극감, 발열, 통증, 짓무름, 수포 등의 증상이 나타나는 경우

(2) 2주정도 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우

4. 기타 이 약의 사용 시 주의사항

(1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.

(2) 어린이에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 사용할 것.

(3) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 말 것.

(4) 눈에 들어가지 않도록 주의할 것. 만일 눈에 들어간 경우에는 즉시 물로 씻고 안과전문의의 진찰을 받을 것.

(5) 질환부위와 그 주위를 깨끗이 한 후 사용할 것.

(6) 이 약과 와파린을 병용 시 항응고 효과를 상승시킬 수 있음

(7) 의사의 지시가 없는 한 밀봉봉대법 또는 포장법을 사용하지 말 것

5. 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

(2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.

(3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.