

사용상의주의사항

1. 다음 환자 (부위)에는 투여하지 마십시오.

1) 30 개월 이하의 유아

2) 습진, 옻 등에 의한 피부염, 상처부위

2. 다음 사람은 신중히 투여하십시오.

1) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상 (예를 들면 발진·발적[충혈되

어 붉어짐], 가려움, 옻 등에 의한 피부염 등) 이 나타난 적이 있는 환자

2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자

3) 습윤[습기 참]이나 미란[짓무름]이 심한 환자

4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

5) 소아 (경련을 유발할 수 있습니다)

6) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(살리실산염은 피부를 통하여 많은 양이 흡수되어 중독 증상이 나타날 수 있으므로 넓은 피부표면에 대한 임부의 장기간의 사용은 피한다)

3. 부작용

이 약의 사용으로 인해 발진·발적[충혈되어 붉어짐], 가려움 등의 증상이 나타나는

경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

4. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.

2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 사용하십시오.

3) 5 ~ 6 일간 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오

5. 적용상의 주의

이 약은 외용으로만 사용하십시오.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여[뚜껑을 꼭 닫아] 보관하십시오.

3) 오용[잘못 사용]을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.