

사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람(신체 부위에)은 이 약을 사용하지 말 것

1) 얼굴, 간찰부위(겹쳐진 피부), 항문생식기, 눈 주위, 점막

2) 당뇨병 환자 또는 말초 혈액 순환 장애가 있는 환자

3) 점, 모반, 털이 많은 사마귀 또는 기타 피부 병변

4) 2세 미만의 소아

5) 이 약 또는 이 약 성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 사용 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(살리실산염은 피부를 통하여 많은 양이 흡수되어 중독 증상이 나타날 수 있으므로 넓은 피부표면에 대한 임부의 장기간의 사용은 피한다)

2) 정기적으로 피부의 넓은 영역을 치료해야 하는 수유부

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부 문서를 소지할 것

1) 이 약은 특정 환자에게 자극을 줄 수 있으며, 드물게 피부에 일시적인 잡티가 나타날 수 있다.

2) 경미하고 일시적인 자극이 예상될 수 있지만, 더 심각하거나 지속적인 통증 및 자극이 있는 경우 치료를 연기하거나 중단해야 한다.

4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

1) 눈과 점막에서 멀리 떨어져 사용한다.

2) 주변 정상 피부의 자극을 피하기 위해 사마귀, 무사마귀, 티눈 및 못(굳은살)에만 조심스럽게 바른다.

3) 증기를 흡입하지 않도록 주의한다.

4) 내성이 있는 병변이 사라지는데 최대 12주가 소요될 수 있다.

5) 이 약을 과도하게 사용하면 피부에 자극을 줄 수 있다. 이 경우 이 약을 더 적게 사용하거나 덜 자주 사용해야 한다.

6) 우발적으로 섭취한 경우, 2-5% 중탄산나트륨 수용액으로 즉시 위세척을 해야 한다. 체액 및 전해질의 균형을 모니터링하고 적절한 조치를 취해야 한다. 증상으로는 두통, 메스꺼움, 구토, 설사 및 호흡기능 저하가 있다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.
- 3) 화기에 가까이 하지 않는다. 극도의 가연성이 있다.
- 4) 유출을 피한다.
- 5) 사용 후 뚜껑을 꼭 닫아 보관한다.