

사용상의주의사항

1) 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

(1) 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 사람

2) 이 약은 다음의 신체 부위에는 사용하지 말 것.

(1) 눈 또는 누주위, 점막 등

(2) 습진, 욕 등에 의한 피부염, 상처 부위, 민감함 피부

3) 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

(1) 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(발진·발적, 가려움, 욕 등에 의한 피부염 등)이

나타난 적이 있는 사람

(2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람

(3) 습윤이나 미란(긁무름)이 심한 환자

(4) 의사의 치료를 받고 있는 사람

(5) 순환기 장애 또는 당뇨병 환자

(6) 12세 이하의 소아

(7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(살리실산염은 피부를 통하여 많은 양이 흡수되어 중독 증상이 나타날 수 있으므로 넓은 피부표면에 대한 임부의 장기간의 사용은 피한다)

4) 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상담 시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

(1) 이 약의 사용으로 인해 발진·발적, 종창, 가려움, 통증 등의 증상이 나타나는 경우

(2) 5~6일간 사용해도 증상이 개선되지 않는 경우

5) 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

(1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.

(2) 소아에 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 사용할 것.

(3) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복 또는 흡입하지 말 것.

(4) 눈에 들어가지 않도록 주의할 것. 만일 눈에 들어간 경우에는 물로 씻을 것.

증상이 심한 경우에는 안과 의사의 치료를 받을 것.

(5) 약액이 묻은 손이 눈 등 점막에 닿으면 자극이 있으므로 손에 묻은 약액은 잘 씻을 것.

(6) 적용부위를 싸거나 감지 않고, 외부의 열이나 뜨거운 물에 노출하지 말 것.

(7) 이 약을 사용한 부위에 물이 닿은 경우, 강한 자극을 느낄 수 있음.

(8) 피부가 특히 약한 환자는 동일한 부위에 이 약을 연속적으로 사용하지 말 것.

6) 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

(2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 보관할 것.

(3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고

발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.